

# Differentialregning

---

## Definition

Funktionen  $f$  siges at være differentiabel i  $x_0$  hvis følgende grænseværdien findes

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Denne grænseværdi kaldes differentialkvotienten for  $f$  i  $x_0$  og benævnes  $f'(x_0)$ .

Tallet  $f'(x_0)$  er hældningen for tangenten til grafen for  $f$  i punktet  $(x_0, f(x_0))$ .

$f'(x_0)$  læses som "f mærke af  $x_0$ "

---

En Ligning for **tangenten** til grafen for  $f$  i punktet  $(x_0, f(x_0))$  bestemmes ved hjælp af følgende ligning:

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

---

Eks.

En ligning for tangenten til grafen for  $f(x) = 3x^2 + 4x + 1$  i punktet  $(-1, f(-1))$  ønskes bestemt.

Vi indsætter  $x_0 = -1$  i tangentens ligning:  $y = f'(-1)(x - (-1)) + f(-1)$  og udregner  $f'(-1)$  samt  $f(-1)$ .

For at bestemme  $f'(-1)$  bestemmes først  $f'(x)$ :  $f'(x) = 2 \cdot 3x + 4 = 6x + 4$ ,  $x_0 = -1$  indsættes:

$$f'(-1) = 6 \cdot (-1) + 4 = -2. Vi skal desuden udregne f(-1): f(-1) = 3 \cdot (-1)^2 + 4 \cdot (-1) + 1 = 0.$$

Tallene  $f'(-1) = -2$  og  $f(-1) = 0$  indsættes i  $y = f'(-1)(x - (-1)) + f(-1)$ :

$$y = -2 \cdot (x - (-1)) + 0 \Leftrightarrow y = -2 \cdot (x + 1) \Leftrightarrow \underline{\underline{y = -2x - 2}}$$

---

## Tabellen:

---

$f(x)$	$ax+b$	$x$	$ax^2 + bx + c$	$k$	$\sqrt{x}$	$\frac{1}{x}$
$f'(x)$	$a$	$1$	$2ax+b$	$0$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$-\frac{1}{x^2}$

$f(x)$	$x^n, n \neq -1$	$e^x$	$e^{kx}$	$a^x$	$\ln(x)$	
$f'(x)$	$n \cdot x^{n-1}$	$e^x$	$k \cdot e^{kx}$	$a^x \cdot \ln(a)$	$\frac{1}{x}$	

**Husk:**  $\frac{1}{x^n} = x^{-n}$

---

## Regneregler:

---

Sum:  $(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x)$

Differens:  $(f - g)'(x) = f'(x) - g'(x)$

Gange en konstant:  $(k \cdot f)'(x) = k \cdot f'(x)$

Produkt:  $(f \cdot g)'(x) = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$

Kvotient:  $\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{g(x)^2}$

Sammensat funktion:  $(f \circ g)'(x) = (f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

---